



Estudio de pH Bravo

Áreas examinadas y tratadas	
Áreas	• Esófago • Esófago inferior cerca del área de reflujo • Exposición al ácido en el esófago • Correlación de los síntomas con episodios de reflujo

El procedimiento	
Estudio de pH Bravo	
Diagnóstico	• Es un estudio inalámbrico para monitorear el reflujo ácido • Mide los niveles de ácido en el esófago • Se fija una pequeña cápsula al revestimiento del esófago • La cápsula envía las mediciones a un registrador que lleva el paciente • Ayuda a relacionar los síntomas de reflujo con los episodios de ácido
Terapéutico	• La cápsula por sí sola no realiza ningún tratamiento • Las recomendaciones de tratamiento se hacen después de revisar los resultados • Se pueden comentar medicamentos, cambios de estilo de vida o estudios adicionales



Antes de su procedimiento	
Programe su procedimiento	
Cita	• Programe su cita para el estudio de pH Bravo con GastroDoxs por teléfono al 832-632-4070 o en la oficina
Ubicación	• Se sugerirá un lugar para el procedimiento según su seguro y su área geográfica • Consulte la página de ubicaciones en nuestro sitio web
Seguro	• Nuestro equipo obtendrá la autorización previa del seguro si es necesaria
Financiero	• Los honorarios del proveedor de GastroDoxs se cobrarán al programar su procedimiento
Órdenes	• Nuestro equipo enviará las órdenes de su procedimiento al centro quirúrgico
Transporte	• No conduzca después del procedimiento si se utiliza sedación • Debe tener a una persona de 18 años o más que lo lleve a casa • No Uber Lyft taxi



Cambios	• Para cancelar o reprogramar, llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070
Regístrese en el centro quirúrgico	
General	• Un representante del hospital o centro quirúrgico le llamará para explicar el proceso de registro, la hora y el lugar de su procedimiento
Clínico	• El equipo de evaluación previa hablará con usted sobre lo siguiente: • Autorización médica si es necesaria • Historial médico • Medicamentos • Cuestionario de preanestesia • Antecedentes quirúrgicos • Antecedentes de marcapasos, desfibrilador o alergia al níquel
Financiero	• Los cargos del hospital, anestesia y patología son independientes de GastroDoxs • Los demás cargos no relacionados con GastroDoxs deben consultarse directamente con los otros proveedores, el hospital o el centro quirúrgico • Si no ha recibido noticias del representante financiero 24 horas antes del procedimiento, llámelo en ese momento



Autorización médica	
Cardiología Hematología Neurología Neumología	• Puede necesitar autorización médica si tiene afecciones de alto riesgo • Puede necesitar una consulta con su médico o proveedor antes de que pueda emitir la autorización • Nuestro equipo enviará a su médico o proveedor una solicitud de autorización médica • Cuando recibamos su autorización médica, le llamaremos para programar el procedimiento • Informe al equipo si tiene marcapasos, desfibrilador, estrechamiento esofágico, várices o alergia al níquel • Puede necesitar autorización si toma anticoagulantes o estos medicamentos • Apixaban Eliquis • Clopidogrel Plavix • Dabigatran Pradaxa • Rivaroxaban Xarelto • Warfarin Coumadin & Jantoven



Medicamentos	
1 semana antes	• Suspenda > inhibidores de la bomba de protones, salvo que se le indique lo contrario - o Omeprazol Prilosec - o Pantoprazol Protonix - o Esomeprazol Nexium - o Lansoprazol Prevacid • Suspenda > Medicamentos agonistas de GLP-1: - o Dulaglutida (Trulicity) - o Exenatida (Byetta) - o Exenatida de liberación prolongada (Bydureon BCise) - o Liraglutida (Victoza) - o Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) - o Tirzepatida (Mounjaro)
1 día antes	• Suspenda > Antidiabéticos orales si se le indica • Suspenda > medicamentos para el reflujo según las instrucciones • Insulina > Tome la dosis ajustada si se le indica
Día del procedimiento	• Presión arterial > según las instrucciones del equipo de evaluación previa • Insulina > Suspenda, salvo que se le indique lo contrario • Otros > Suspenda, salvo que se le indique lo contrario



Otros	• Continúe tomando sus medicamentos, salvo que se indique lo contrario • Los anticoagulantes pueden requerir una autorización médica antes de programar, si es necesario • El equipo de evaluación previa (PAT) revisará sus medicamentos y puede hacer otras recomendaciones
Instrucciones sobre la dieta	
2 semanas antes	
Alimentos	Sin cambios, salvo que su proveedor le indique lo contrario
Líquidos	Beba mucha agua
1 semana antes	
Alimentos	• No se requiere un cambio especial en la dieta, salvo que se le indique • Evite alimentos que desencadenen reflujo si su proveedor lo recomienda • Siga cuidadosamente las instrucciones para suspender medicamentos
Líquidos	Beba mucha agua
1 día antes	
Alimentos	• Se pueden recomendar comidas ligeras • Suspenda - todos los alimentos después de las 12am (medianoche), salvo que se le indique lo contrario



Líquidos	• Beba mucha agua hasta la hora límite permitida • No consuma alcohol • Suspenda - todos los líquidos después de las 12am (medianoche), salvo que se le indique lo contrario
Día del procedimiento	
Día del procedimiento	• No coma ni beba líquidos el día del procedimiento, salvo que se le indique lo contrario • Presión arterial > según las instrucciones del equipo de evaluación previa • Insulina > Suspenda, salvo que se le indique lo contrario • Otros > Suspenda, salvo que se le indique lo contrario

Instrucciones del registrador Bravo	
Registrador Diario Cápsula	• Mantenga el registrador cerca de su cuerpo durante el estudio • Presione el botón de síntomas cuando aparezcan síntomas • Registre comidas, cuando se acueste, cuando se levante y los síntomas • No reinicie los medicamentos para el reflujo a menos que se le indique • Devuelva el registrador y el diario cuando termine el estudio



Dieta	No coma ni beba líquidos el día del procedimiento, salvo que se le indique lo contrario
Llegada	• Llegue entre 1 y 1.5 horas antes de su procedimiento • Al llegar, deberá registrarse
Antes del procedimiento	• El equipo clínico revisará la evaluación, los riesgos y los beneficios del procedimiento • El equipo de anestesia le explicará todos los aspectos antes del procedimiento • Deberá firmar los formularios de consentimiento del procedimiento
Sedación	• Se colocará una vía intravenosa en su brazo para administrar medicamentos • Se le administrará sedación intravenosa durante el procedimiento
Posición	• Se le indicará que se acueste sobre el lado izquierdo



Colocación	• Después de la sedación, se introduce suavemente un endoscopio superior por la boca hasta el esófago • La cápsula Bravo se fija al revestimiento del esófago • La cápsula comienza a medir el ácido y envía las lecturas al registrador
Después del procedimiento	• La recuperación de la anestesia tarda aproximadamente de 30 minutos a 1 hora • El equipo clínico vigilará dolor en el pecho, vómitos, mareo, problemas de presión arterial o frecuencia cardíaca, fiebre o dificultad para tragar • Si se encuentra bien y ha despertado de la anestesia, probablemente recibirá el alta para ir a casa
Diagnóstico	• La cápsula registra la exposición al ácido en el esófago • El registrador almacena los datos de ácido durante el estudio • El diario ayuda a comparar los síntomas con los episodios de reflujo ácido
Terapéutico	• La cápsula no realiza ningún tratamiento • Las recomendaciones de tratamiento se darán después de completar y revisar el estudio



Patólogo	• Por lo general no aplica al estudio de pH Bravo, salvo que se tomen biopsias durante la endoscopia superior • Si se toman biopsias, un patólogo puede revisar las muestras de tejido • El patólogo enviará los informes a nuestra oficina
Seguimiento	• Nuestros proveedores revisarán el informe en detalle • Los hallazgos se revisarán con usted en detalle durante el seguimiento

Después de su procedimiento	
Recuperación	• Permanecerá en observación durante 30 minutos para vigilar cualquier síntoma • Puede estar despierto en unos 30 minutos, pero aún sentirse somnoliento durante 12-24 horas • No conduzca durante el resto del día después del procedimiento • La cápsula se desprenderá sola y se eliminará de forma natural



Transporte	• No conduzca después del procedimiento • Debe tener a una persona de 18 años o más que lo lleve a casa • No Uber Lyft taxi
Síntomas	Síntomas normales después del procedimiento: • Dolor de garganta leve • Molestia leve en el pecho • Sensación de la cápsula • Molestia leve al tragar • Distensión o gases leves Síntomas anormales después del procedimiento: • Dolor intenso en el pecho • Dificultad para respirar • Dificultad para tragar que empeora • Vómitos con sangre • Heces negras y alquitranadas • Fiebre > 100 • Dolor abdominal intenso • Cualquier otro síntoma intenso o inusual • Llame al 911 y vaya a la sala de emergencias más cercana
Cita	Asegúrese de tener seguimiento 2-3 semanas después del procedimiento



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Resultados	• Sus resultados se explicarán en detalle • Se darán recomendaciones de tratamiento
Preguntas	Llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070