



Endoscopia con cápsula

Áreas examinadas y tratadas	
Áreas	• Duodeno • Yeyuno • Íleon

El procedimiento	
Endoscopia con cápsula	
Diagnóstico	La endoscopia con cápsula consiste en tragar una cápsula del tamaño de una vitamina que toma miles de imágenes mientras recorre el sistema digestivo



Antes de su procedimiento	
Programe su procedimiento	
Cita	Programe su cita para el procedimiento con GastroDoxs por teléfono al 832-632-4070 o en la oficina
Ubicación	El procedimiento se realiza en nuestra clínica
Seguro	Si el procedimiento requiere autorización previa, nuestra oficina obtendrá la autorización necesaria
Financiero	Los honorarios del procedimiento de GastroDoxs se cobrarán al programarlo
Cambios	Para cancelar o reprogramar, llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070



El día antes de su procedimiento	
Limpieza	La limpieza del intestino delgado es necesaria para obtener la mejor visualización
Alimentos	Dieta de líquidos claros
Medicamento	• 6pm - Beba 7 medidas de Miralax de venta libre - PEG 3350, 119 g, con 32 oz de agua • 7pm - Tome Mylicon de venta libre - simeticona 0.6 ml con 8 oz de agua • 10pm - No coma ni beba después de las 10pm, excepto agua o medicamentos



Día del procedimiento	
Alimentos	No coma ni beba el día del procedimiento, excepto agua, medicamentos, Miralax o Mylicon
Medicamento	• 6am - Beba 1 medida de Miralax de venta libre - PEG 3350, 17 g, con 8 oz de agua • 7am - Tome Mylicon de venta libre - simeticona 0.6 ml con 8 oz de agua
Llegada	Llegue a la oficina a la hora programada para su procedimiento
Ingestión	Al llegar, se le pedirá que trague la CapsoCam



Recuperación de la cápsula	• Se le entregará un kit para recuperar la cápsula • Nuestro personal le mostrará cómo usar el recipiente-colador y la varilla para recuperarla • Use el recipiente-colador en cada evacuación hasta recuperar la cápsula • Una vez recuperada, coloque la cápsula en el frasco provisto • Asegure bien la tapa del frasco y colóquelo en el sobre provisto • La cápsula puede tardar entre 4 y 36 horas en salir
Envío	• Se le dará una etiqueta de envío de FedEx • Pegue la etiqueta al sobre y déjelo en el punto de entrega FedEx más cercano



Después de ingerir la cápsula

Alimentos	• 2 horas después - tras ingerir la cápsula, reanude la dieta de líquidos claros • 2pm - Se permite un almuerzo ligero • 8pm - Se permite una cena ligera
Medicamento	• 2 horas después - Puede reanudar todos los medicamentos • 4 horas después - Beba 1 medida de Miralax de venta libre - PEG 3350, 17 g, con 8 oz de agua

Después de su procedimiento

Alimentos	Puede reanudar su dieta normal el día después del procedimiento
Medicamentos	Reanude su horario normal de medicamentos el día después del procedimiento
Recuperación de la cápsula	Es muy importante usar el recipiente-colador para recuperar la cápsula
Envío	Siga las instrucciones para enviar la cápsula



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Cápsula no localizada ni recuperada	Llame a nuestra oficina después de 72 horas si la cápsula no ha salido
Cita	Asegúrese de tener seguimiento 2-3 semanas después del procedimiento
Resultados	• Sus resultados se explicarán en detalle • Se darán recomendaciones de tratamiento
Preguntas	Llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070