



Paracentesis

Áreas examinadas y tratadas	
Áreas	• Abdomen • Cavidad peritoneal • Líquido ascítico • Líquido alrededor de los órganos abdominales

El procedimiento	
Paracentesis	
Diagnóstico	• Es un procedimiento para extraer líquido del abdomen • La acumulación de líquido se llama ascitis • Se introduce una aguja o un catéter pequeño a través de la pared abdominal • Puede extraerse líquido para análisis • Puede usarse ultrasonido para localizar la zona de líquido más segura
Terapéutico	• Puede extraerse una mayor cantidad de líquido para aliviar los síntomas • Puede reducir la hinchazón, la tensión, el dolor abdominal o la falta de aire • Puede administrarse albúmina si se extrae una gran cantidad de líquido



Antes de su procedimiento	
Programe su procedimiento	
Cita	Programe su cita para la paracentesis con GastroDoxs por teléfono al 832-632-4070 o en la oficina
Ubicación	• Se sugerirá un lugar para el procedimiento según su seguro y su área geográfica • Consulte la página de ubicaciones en nuestro sitio web
Seguro	Nuestro equipo obtendrá la autorización previa del seguro si es necesaria
Financiero	Los honorarios del proveedor de GastroDoxs se cobrarán al programar su procedimiento
Órdenes	Nuestro equipo enviará las órdenes de su procedimiento al hospital, centro de radiología o centro quirúrgico



Transporte	• Por lo general no se utiliza sedación para la paracentesis • Si se usa sedación, no conduzca después del procedimiento • Si se usa sedación, debe tener a una persona de 18 años o más que lo lleve a casa • No Uber Lyft taxi si se utiliza sedación
Cambios	Para cancelar o reprogramar, llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070
Regístrese en el centro	
General	• Un representante del hospital, centro de radiología o centro quirúrgico le llamará para explicar el proceso de registro, la hora y el lugar de su procedimiento
Clínico	• El equipo de evaluación previa puede hablar con usted sobre lo siguiente: • Historial médico • Antecedentes de enfermedad hepática • Antecedentes de ascitis • Medicamentos • Uso de anticoagulantes • Resultados recientes de laboratorio



Financiero	• Los cargos del hospital, radiología, anestesia y laboratorio son independientes de GastroDoxs • Los demás cargos no relacionados con GastroDoxs deben consultarse directamente con los otros proveedores o el centro • Si no ha recibido noticias del representante financiero 24 horas antes del procedimiento, llámelo en ese momento
-------------------	---



Autorización médica	
Cardiología Hematología Neurología Neumología	• Puede necesitar autorización médica si tiene afecciones de alto riesgo • Puede necesitar una consulta con su médico o proveedor antes de que pueda emitir la autorización • Nuestro equipo enviará a su médico o proveedor una solicitud de autorización médica • Cuando recibamos su autorización médica, le llamaremos para programar el procedimiento • Puede ser necesario realizar análisis de sangre antes del procedimiento • Puede necesitar instrucciones si toma anticoagulantes o estos medicamentos • Apixaban Eliquis • Clopidogrel Plavix • Dabigatran Pradaxa • Rivaroxaban Xarelto • Warfarin Coumadin & Jantoven



Medicamentos	
2 semanas antes	• Por lo general no se necesitan cambios de medicamentos, salvo que se le indique • Si se planea sedación, pueden aplicarse instrucciones para medicamentos GLP-1 • Informe al equipo sobre todos los medicamentos recetados y de venta libre
1 semana antes	• Los anticoagulantes pueden requerir instrucciones especiales • No suspenda los anticoagulantes a menos que su proveedor se lo indique • Continúe los demás medicamentos, salvo que se le indique otherwise
1 día antes	• Medicamentos orales para la diabetes > siga las instrucciones de evaluación previa • Insulina > tome una dosis ajustada solo si se le indica • Diuréticos o pastillas de agua > siga las instrucciones de su proveedor
Día del procedimiento	• Presión arterial > según las instrucciones del equipo de evaluación previa • Insulina > siga las instrucciones de evaluación previa • Diuréticos > siga las instrucciones de su proveedor • Otros > suspenda solo si se le indica



Otros	• Continúe tomando sus medicamentos, salvo que se indique lo contrario • Los anticoagulantes pueden requerir autorización o instrucciones especiales • El equipo de evaluación previa (PAT) revisará sus medicamentos y puede hacer otras recomendaciones
Instrucciones sobre la dieta	
2 semanas antes	
Alimentos	Sin cambios, salvo que su proveedor le indique lo contrario
Líquidos	Beba agua según las instrucciones de su proveedor
1 semana antes	
Alimentos	• No se requiere un cambio especial en la dieta, salvo que se le indique • Siga cualquier dieta baja en sodio indicada por su proveedor • Evite el alcohol
Líquidos	• Siga las restricciones de líquidos si se las han indicado • De lo contrario, beba líquidos según las instrucciones de su proveedor



1 día antes	
Alimentos	• Coma según las instrucciones del centro • Si se planea sedación, deje de comer después de las 12am (medianoche), salvo que se le indique lo contrario
Líquidos	• Si se planea sedación, deje de beber líquidos después de las 12am (medianoche), salvo que se le indique lo contrario • No consuma alcohol • Siga las restricciones de líquidos si se las han indicado
Día del procedimiento	
Día del procedimiento	• Si no se planea sedación, el centro puede permitir alimentación normal o ligera • Si se planea sedación, no coma ni beba líquidos salvo que se le indique lo contrario • Tome medicamentos solo según se le indique • Vacíe la vejiga antes del procedimiento
Paracentesis Instrucciones de preparación	
Instrucciones de preparación	• Siga las instrucciones del centro sobre la llegada y el ayuno • Lleve su tarjeta del seguro y una identificación con foto • Lleve su lista de medicamentos • Complete los análisis de sangre requeridos si fueron ordenados • Informe al equipo si toma anticoagulantes • Vacíe la vejiga antes del procedimiento



Día del procedimiento	
Dieta	Siga las instrucciones del centro sobre alimentos y líquidos
Llegada	• Llegue a la hora indicada por el centro • Al llegar, deberá registrarse
Antes del procedimiento	• El equipo clínico revisará su historial médico, medicamentos, alergias y resultados de laboratorio • Pueden revisar su presión arterial, frecuencia cardíaca y nivel de oxígeno • Deberá firmar los formularios de consentimiento del procedimiento
Anestesia local	• Se inyectará anestesia local en la piel • Puede sentir un pequeño pinchazo o ardor • El área debe quedar adormecida antes de extraer el líquido
Posición	• Puede acostarse boca arriba o ligeramente de lado • Se colocará el abdomen para permitir un acceso seguro



Ultrasonido	• Puede utilizarse ultrasonido para localizar el líquido • Puede marcarse en el abdomen el sitio de entrada más seguro • Se limpiará la piel y pueden colocarse campos estériles
Después del procedimiento	• Se introduce una aguja o un catéter pequeño a través de la pared abdominal • El líquido drenará por un tubo hacia un recipiente de recolección • Después de retirar el catéter se aplica presión y se coloca un vendaje • Puede permanecer en observación durante un breve periodo después del procedimiento
Diagnóstico	• Puede enviarse una pequeña cantidad de líquido al laboratorio • Los análisis pueden detectar infección, sangrado, células cancerosas, causas hepáticas u otras causas
Terapéutico	• Puede extraerse una mayor cantidad de líquido para aliviar los síntomas • La extracción de líquido puede reducir la presión abdominal y mejorar la respiración o comodidad • Puede administrarse albúmina si se extrae una gran cantidad de líquido



Laboratorio	• El laboratorio puede analizar las muestras de líquido • Si se solicita citología, las células pueden examinarse al microscopio • Los informes se enviarán a nuestra oficina
Seguimiento	• Nuestros proveedores revisarán el informe en detalle • Los hallazgos se revisarán con usted en detalle durante el seguimiento

Después de su procedimiento	
Recuperación	• Puede permanecer en observación después del procedimiento • Pueden revisar su presión arterial y el sitio de punción • Puede tener dolor leve en el sitio de punción • Evite actividad intensa según las instrucciones del centro



Transporte	• Si no se utilizó sedación, puede conducir salvo que se le indique lo contrario • Si se utilizó sedación, no conduzca durante el resto del día • Si se utilizó sedación, una persona de 18 años o más debe llevarlo a casa • No Uber Lyft taxi si se utilizó sedación
Síntomas	Síntomas normales después del procedimiento: • Dolor leve en el sitio de punción • Moretón leve • Molestia abdominal leve • Pequeña cantidad de drenaje claro • Cansancio después del procedimiento Síntomas anormales después del procedimiento: • Fiebre > 100 • Dolor abdominal intenso • Aumento de enrojecimiento, hinchazón, calor o pus en el sitio • Sangrado abundante del sitio • Salida de líquido que no se detiene • Mareo o desmayo • Falta de aire • Cualquier otro síntoma intenso o inusual • Llame al 911 y vaya a la sala de emergencias más cercana



Cita	Asegúrese de tener seguimiento 2-3 semanas después del procedimiento, o según se le indique
Resultados	• Sus resultados se explicarán en detalle • Se darán recomendaciones de tratamiento • Pueden recomendarse estudios adicionales del hígado, imágenes o laboratorio
Preguntas	Llame o envíe un mensaje de texto a GastroDoxs al 832-632-4070