



Thắt búi trĩ bằng vòng cao su

Các khu vực được khám và điều trị

Các khu vực

- Hậu môn
- Trực tràng

Thủ thuật

Thắt búi trĩ bằng vòng cao su

Điều trị

- Thắt vòng cao su là thủ thuật được bác sĩ thực hiện tại phòng khám để điều trị trĩ nội
- Ít xâm lấn hơn nhiều so với phẫu thuật cắt trĩ, đây là thủ thuật đơn giản có thể thực hiện tại phòng khám chỉ trong vài phút và thường ít gây khó chịu
- Hầu hết bệnh nhân có thể trở lại làm việc trong cùng ngày
- Tất cả bệnh nhân cần thực hiện 3 buổi điều trị
- Khoảng cách giữa các buổi điều trị là 2 tuần
- Đôi khi có thể cần buổi điều trị thứ 4



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Trước thủ thuật	
Đặt lịch thủ thuật	
Lịch hẹn	Đặt lịch thủ thuật với GastroDoxs qua điện thoại số 832-632-4070 hoặc tại phòng khám
Địa điểm	Thủ thuật được thực hiện tại phòng khám của chúng tôi
Bảo hiểm	Nếu thủ thuật cần phê duyệt trước từ bảo hiểm, phòng khám của chúng tôi sẽ thực hiện việc xin phê duyệt cần thiết
Tài chính	Phí thủ thuật của GastroDoxs sẽ được thu khi bạn lên lịch thủ thuật
Thay đổi	Để hủy hoặc đổi lịch, hãy gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070
Thuốc đang dùng	
Thuốc đang dùng	• Dùng thuốc như bình thường • Nếu bạn dùng bất kỳ thuốc làm loãng máu nào ngoài Aspirin, không thể thực hiện thắt búi trĩ bằng vòng cao su



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Ngày thực hiện thủ thuật

Ngày thực hiện thủ thuật

Trong thủ thuật thắt vòng cao su, bác sĩ sẽ dùng một dụng cụ để đặt vòng cao su nhỏ, thường chỉ rộng vài milimét, quanh chân búi trĩ

Sau thủ thuật

Triệu chứng

Các triệu chứng bình thường sau thủ thuật:

- Chảy máu trực tràng nhẹ
 - Cảm giác hơi căng tức
- Các triệu chứng bất thường sau thủ thuật:
- Đau dữ dội
 - Chảy máu đáng kể
 - Gọi 911 và đến phòng cấp cứu gần nhất

Câu hỏi

Gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070