



Chọc tháo dịch ổ bụng

Các khu vực được khám và điều trị

Các khu vực	• Bụng • Khoang phúc mạc • Dịch cổ trướng • Dịch quanh các cơ quan trong ổ bụng
--------------------	---

Thủ thuật

Chọc tháo dịch ổ bụng

Chẩn đoán	• Đây là thủ thuật rút dịch khỏi ổ bụng • Sự tích tụ dịch này được gọi là cổ trướng • Một kim hoặc ống thông nhỏ được đặt qua thành bụng • Dịch có thể được rút ra để xét nghiệm • Có thể sử dụng siêu âm để xác định ổ dịch an toàn nhất
Điều trị	• Có thể rút lượng dịch lớn hơn để giảm triệu chứng • Có thể làm giảm chướng bụng, căng tức, đau hoặc khó thở • Có thể truyền albumin nếu rút một lượng dịch lớn



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Trước thủ thuật	
Đặt lịch thủ thuật	
Lịch hẹn	Đặt lịch Chọc tháo dịch ổ bụng với GastroDoxs qua điện thoại số 832-632-4070 hoặc tại phòng khám
Địa điểm	• Địa điểm thực hiện thủ thuật sẽ được đề xuất dựa trên bảo hiểm và khu vực địa lý của bạn • Vui lòng xem trang Địa điểm trên trang web của chúng tôi
Bảo hiểm	Nhóm của chúng tôi sẽ xin phê duyệt trước từ bảo hiểm nếu cần
Tài chính	Phí nhà cung cấp dịch vụ GastroDoxs sẽ được thu khi lên lịch thủ thuật
Chỉ định	Nhóm của chúng tôi sẽ gửi chỉ định thủ thuật của bạn đến bệnh viện, trung tâm chẩn đoán hình ảnh hoặc trung tâm phẫu thuật



Phương tiện di chuyển	• Thông thường không dùng thuốc an thần cho chọc tháo dịch ổ bụng • Nếu dùng thuốc an thần, không nên tự lái xe sau thủ thuật • Bạn phải có người từ 18 tuổi trở lên đưa bạn về nhà nếu có dùng thuốc an thần • Không Uber Lyft Taxi nếu có dùng thuốc an thần
Thay đổi	Để hủy hoặc đổi lịch, hãy gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070
Đăng ký với cơ sở y tế	
Chung	• Đại diện bệnh viện, trung tâm chẩn đoán hình ảnh hoặc trung tâm phẫu thuật sẽ gọi cho bạn để trao đổi về quy trình đăng ký, thời gian và địa điểm thực hiện thủ thuật
Lâm sàng	• Nhóm đánh giá trước thủ thuật có thể trao đổi về các nội dung sau: • Tiền sử bệnh • Tiền sử bệnh gan • Tiền sử cổ trướng • Thuốc đang dùng • Đang sử dụng thuốc làm loãng máu • Kết quả xét nghiệm gần đây



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Tài chính	• Phí bệnh viện, chẩn đoán hình ảnh, gây mê và xét nghiệm được tính độc lập với GastroDoxs • Các khoản phí khác không liên quan đến GastroDoxs cần được trao đổi • trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở khác • Nếu bạn chưa nhận được liên hệ từ đại diện tài chính 24 giờ trước thủ thuật, hãy gọi cho họ vào thời điểm đó
------------------	--



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Giấy xác nhận đủ điều kiện

**Tim mạch
Huyết học
Thần kinh
Hô hấp**

- Bạn có thể cần giấy xác nhận đủ điều kiện nếu có tình trạng nguy cơ cao cần đánh giá
- Bạn có thể cần tái khám với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ trước khi họ có thể cấp giấy xác nhận đủ điều kiện
- Nhóm của chúng tôi sẽ gửi yêu cầu giấy xác nhận đủ điều kiện đến bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn
- Khi nhóm của chúng tôi nhận được giấy xác nhận đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gọi cho bạn để lên lịch thủ thuật
- Có thể cần xét nghiệm máu trước thủ thuật
- Bạn có thể cần hướng dẫn riêng nếu đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc các thuốc này
 - Apixaban | Eliquis
 - Clopidogrel | Plavix
 - Dabigatran | Pradaxa
 - Rivaroxaban | Xarelto
 - Warfarin | Coumadin & Jantoven

Điện thoại: 832-632-4070 | Fax: 832-688-9496

Email: info@gastrodoxs.com | Trang web: www.gastrodoxs.com



Thuốc đang dùng	
2 tuần trước	• Thông thường không cần thay đổi thuốc trừ khi được hướng dẫn • Nếu dự kiến dùng an thần, có thể áp dụng hướng dẫn về thuốc GLP-1 • Cho nhóm chăm sóc biết tất cả thuốc kê đơn và không kê đơn bạn đang dùng
1 tuần trước	• Thuốc làm loãng máu có thể cần hướng dẫn đặc biệt • Không ngừng thuốc làm loãng máu trừ khi bác sĩ hướng dẫn • Tiếp tục các thuốc khác trừ khi được hướng dẫn khác
1 ngày trước	• Thuốc tiểu đường đường uống > làm theo hướng dẫn của nhóm đánh giá trước thủ thuật • Insulin > Chỉ dùng liều đã điều chỉnh nếu được hướng dẫn • Thuốc lợi tiểu > làm theo hướng dẫn của bác sĩ
Ngày thực hiện thủ thuật	• Thuốc huyết áp > dùng theo hướng dẫn của nhóm đánh giá trước thủ thuật • Insulin > làm theo hướng dẫn của nhóm đánh giá trước thủ thuật • Thuốc lợi tiểu Thuốc giúp thải nước > làm theo hướng dẫn của bác sĩ • Thuốc khác > chỉ tạm ngưng nếu được hướng dẫn



Khác	• Tiếp tục dùng thuốc như thường lệ, trừ khi có hướng dẫn khác bên dưới • Thuốc làm loãng máu có thể cần giấy xác nhận đủ điều kiện hoặc hướng dẫn đặc biệt • Nhóm đánh giá trước thủ thuật (PAT) sẽ xem xét các thuốc bạn đang dùng và có thể đưa ra thêm khuyến nghị
Hướng dẫn chế độ ăn	
2 tuần trước	
Thức ăn	Không thay đổi trừ khi bác sĩ hướng dẫn
Chất lỏng	Uống nước theo hướng dẫn của bác sĩ
1 tuần trước	
Thức ăn	• Không cần thay đổi chế độ ăn đặc biệt trừ khi được hướng dẫn • Làm theo mọi hướng dẫn về chế độ ăn ít natri do bác sĩ cung cấp • Tránh rượu bia
Chất lỏng	• Làm theo hướng dẫn hạn chế dịch nếu bạn đã được chỉ định • Nếu không, uống chất lỏng theo hướng dẫn của bác sĩ



1 ngày trước	
Thức ăn	• Ăn theo hướng dẫn của cơ sở y tế • Nếu dự kiến dùng an thần, ngừng thức ăn sau 12 giờ đêm trừ khi được hướng dẫn khác
Chất lỏng	• Nếu dự kiến dùng an thần, ngừng chất lỏng sau 12 giờ đêm trừ khi được hướng dẫn khác • Không uống rượu bia • Làm theo hướng dẫn hạn chế dịch nếu được cung cấp
Ngày thực hiện thủ thuật	
Ngày thực hiện thủ thuật	• Nếu không dùng an thần, cơ sở có thể cho phép ăn bình thường hoặc ăn nhẹ • Nếu dự kiến dùng an thần, không ăn hoặc uống trừ khi được hướng dẫn khác • Chỉ dùng thuốc theo hướng dẫn • Đi tiểu hết trước khi thực hiện thủ thuật
Hướng dẫn chuẩn bị chọc tháo dịch ổ bụng	
Hướng dẫn chuẩn bị	• Làm theo hướng dẫn của cơ sở về thời gian đến và nhịn ăn • Mang theo thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh • Mang theo danh sách thuốc đang dùng • Hoàn tất các xét nghiệm máu cần thiết nếu được chỉ định • Cho nhóm chăm sóc biết nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu • Đi tiểu hết trước khi thực hiện thủ thuật



Ngày thực hiện thủ thuật	
Chế độ ăn	Làm theo hướng dẫn của cơ sở về thức ăn và chất lỏng
Khi đến	• Vui lòng đến đúng giờ do cơ sở y tế cung cấp • Bạn sẽ làm thủ tục đăng ký khi đến
Trước thủ thuật	• Nhóm lâm sàng sẽ xem xét tiền sử bệnh, thuốc đang dùng, dị ứng và kết quả xét nghiệm của bạn • Huyết áp, nhịp tim và nồng độ oxy của bạn có thể được kiểm tra • Bạn sẽ cần ký các mẫu đồng ý thực hiện thủ thuật
Gây tê tại chỗ	• Thuốc gây tê tại chỗ sẽ được tiêm vào da • Bạn có thể cảm thấy châm chích hoặc nóng rát nhẹ • Vùng thủ thuật sẽ được gây tê trước khi rút dịch
Tư thế	• Bạn có thể nằm ngửa hoặc hơi nghiêng sang một bên • Bụng sẽ được đặt ở tư thế phù hợp để tiếp cận an toàn



Siêu âm	• Có thể sử dụng siêu âm để xác định vị trí dịch • Vị trí chọc an toàn nhất có thể được đánh dấu trên bụng • Da sẽ được làm sạch và có thể phủ khăn vô khuẩn
Sau thủ thuật	• Một kim hoặc ống thông nhỏ được đưa qua thành bụng • Dịch sẽ chảy qua ống vào bình chứa • Sau khi rút ống thông, sẽ ép tại chỗ và đặt băng • Bạn có thể được theo dõi trong một thời gian ngắn sau thủ thuật
Chẩn đoán	• Một lượng nhỏ dịch có thể được gửi đến phòng xét nghiệm • Xét nghiệm có thể kiểm tra nhiễm trùng, chảy máu, tế bào ung thư, dịch liên quan đến bệnh gan hoặc các nguyên nhân khác
Điều trị	• Có thể rút lượng dịch lớn hơn để giảm triệu chứng • Rút dịch có thể làm giảm áp lực trong bụng và giúp dễ thở hoặc thoải mái hơn • Có thể truyền albumin nếu rút một lượng dịch lớn



Xét nghiệm	• Mẫu dịch có thể được phòng xét nghiệm phân tích • Nếu có chỉ định tế bào học, các tế bào có thể được xem xét dưới kính hiển vi • Báo cáo sẽ được gửi đến phòng khám của chúng tôi
Tái khám	• Các bác sĩ của chúng tôi sẽ xem xét báo cáo chi tiết • Các phát hiện sẽ được trao đổi chi tiết với bạn trong lần tái khám

Sau thủ thuật	
Hồi phục	• Bạn có thể được theo dõi sau thủ thuật • Huyết áp và vị trí chọc kim của bạn có thể được kiểm tra • Bạn có thể hơi đau tại vị trí chọc kim • Tránh hoạt động gắng sức theo hướng dẫn của cơ sở y tế



Phương tiện di chuyển	• Nếu không dùng thuốc an thần, bạn có thể lái xe trừ khi được hướng dẫn khác • Nếu đã dùng thuốc an thần, không lái xe trong thời gian còn lại của ngày • Nếu đã dùng thuốc an thần, bạn phải có người từ 18 tuổi trở lên đưa bạn về nhà • Không Uber Lyft Taxi nếu đã dùng thuốc an thần
Triệu chứng	Các triệu chứng bình thường sau thủ thuật: • Đau nhẹ tại vị trí chọc kim • Bầm tím nhẹ • Khó chịu nhẹ ở bụng • Một lượng nhỏ dịch trong chảy ra • Cảm thấy mệt sau thủ thuật Các triệu chứng bất thường sau thủ thuật: • Sốt > 100°F • Đau bụng dữ dội • Đỏ, sưng, nóng hoặc có mủ tại vị trí thủ thuật ngày càng tăng • Chảy máu nhiều tại vị trí thủ thuật • Rò dịch không ngừng • Chóng mặt hoặc ngất xỉu • Khó thở • Bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng hoặc bất thường nào khác • Vui lòng gọi 911 và đến phòng cấp cứu gần nhất



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Lịch hẹn	Đảm bảo có lịch tái khám sau thủ thuật 2-3 tuần hoặc theo hướng dẫn
Kết quả	• Kết quả của bạn sẽ được trao đổi chi tiết • Sẽ có khuyến nghị điều trị • Có thể được khuyến nghị thực hiện thêm xét nghiệm gan, chẩn đoán hình ảnh hoặc xét nghiệm phòng lab
Câu hỏi	Gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070