



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP

Khu vực được khám và điều trị	
Khu vực	Hệ thống đường mật

Thủ thuật	
Nội soi mật tụy ngược dòng ERCP	
Chẩn đoán	• ERCP là thủ thuật nội soi dùng để xác định sỏi, khối u hoặc chỗ hẹp trong đường mật và ống tụy • ERCP cũng có thể giúp phát hiện tổn thương ung thư hoặc không ung thư • Sau khi ống nội soi kết hợp X-quang được đặt đúng vị trí, một ống thông được đưa vào để bơm thuốc cản quang qua các ống dẫn • ERCP có thể giúp chẩn đoán các vấn đề sau phẫu thuật túi mật



Điều trị	• Sỏi mật có thể được lấy ra khỏi đường mật và đôi khi khỏi ống tụy • ERCP có thể đặt một ống nhựa nhỏ gọi là “stent” nếu đường mật bị tắc • ERCP có thể giúp điều trị các vấn đề sau phẫu thuật túi mật
-----------------	--

Trước thủ thuật	
Đặt lịch thủ thuật	
Lịch hẹn	Đặt lịch thủ thuật với GastroDoxs qua điện thoại số 832-632-4070 hoặc tại phòng khám
Địa điểm	• Địa điểm thực hiện thủ thuật sẽ được đề xuất dựa trên bảo hiểm và khu vực địa lý của bạn • Vui lòng xem trang Địa điểm trên trang web của chúng tôi
Bảo hiểm	Nhóm của chúng tôi sẽ xin phê duyệt trước từ bảo hiểm nếu cần
Tài chính	Phí nhà cung cấp dịch vụ GastroDoxs sẽ được thu khi lên lịch thủ thuật



Chỉ định	Nhóm của chúng tôi sẽ gửi chỉ định thủ thuật của bạn đến trung tâm phẫu thuật
Phương tiện di chuyển	• Không nên tự lái xe sau thủ thuật • Bạn phải có người từ 18 tuổi trở lên đưa bạn về nhà • Không Uber Lyft Taxi
Thay đổi	Để hủy hoặc đổi lịch, hãy gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070
Đăng ký với trung tâm phẫu thuật	
Chung	Đại diện từ bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật sẽ gọi cho bạn để trao đổi về quy trình đăng ký, thời gian và địa điểm thực hiện thủ thuật
Lâm sàng	Nhóm đánh giá trước thủ thuật sẽ trao đổi về các nội dung sau: • Giấy xác nhận đủ điều kiện nếu cần • Tiền sử bệnh • Thuốc đang dùng • Bảng câu hỏi trước gây mê • Tiền sử phẫu thuật



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Tài chính	• Phí bệnh viện, gây mê và giải phẫu bệnh được tính độc lập với GastroDoxs • Các khoản phí khác không liên quan đến GastroDoxs cần được trao đổi trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ khác, bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật • Nếu bạn chưa nhận được liên hệ từ đại diện tài chính 24 giờ trước thủ thuật, hãy gọi cho họ vào thời điểm đó
------------------	--



GastroDoxs
— defenders of the digestive system —

Giấy xác nhận đủ điều kiện

**Tim mạch
Huyết học
Thần kinh
Hô hấp**

- Bạn có thể cần giấy xác nhận đủ điều kiện nếu có tình trạng nguy cơ cao cần đánh giá
- Bạn có thể cần tái khám với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ trước khi họ có thể cấp giấy xác nhận đủ điều kiện
- Nhóm của chúng tôi sẽ gửi yêu cầu giấy xác nhận đủ điều kiện đến bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn
- Khi nhóm của chúng tôi nhận được giấy xác nhận đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gọi cho bạn để lên lịch thủ thuật
- Bạn có thể cần giấy xác nhận đủ điều kiện nếu đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc các thuốc này
 - Apixaban | Eliquis
 - Clopidogrel | Plavix
 - Dabigatran | Pradaxa
 - Edoxaban | Savaysa
 - Prasugrel | Effient
 - Rivaroxaban | Xarelto
 - Ticagrelor | Brilinta
 - Warfarin | Coumadin & Jantoven



Thuốc đang dùng	
1 tuần trước	• Tạm ngưng > Thuốc chống tiêu chảy - Imodium, Kaopectate, Pepto- Bismol • Tạm ngưng > Viên sắt • Tạm ngưng > Vitamin tổng hợp • Tạm ngưng > Thuốc chủ vận GLP-1: • Dulaglutide (Trulicity) • Exenatide (Byetta) • Exenatide phóng thích kéo dài (Bydureon BCise) • Liraglutide (Victoza) • Lixisenatide (Adlyxin) • Semaglutide (Ozempic, Wegovy, Rybelsus) • Tirzepatide (Mounjaro)
1 ngày trước	• Tạm ngưng > Thuốc tiểu đường đường uống • Insulin > Dùng 1/2 liều
Ngày thực hiện thủ thuật	Thuốc huyết áp > dùng theo hướng dẫn của nhóm đánh giá trước thủ thuật
Khác	• Tiếp tục dùng thuốc như thường lệ, trừ khi có hướng dẫn khác bên dưới • Cần có giấy xác nhận đủ điều kiện trong hồ sơ trước khi lên lịch nếu bạn dùng thuốc làm loãng máu • Nhóm đánh giá trước thủ thuật (PAT) sẽ xem xét các thuốc bạn đang dùng và có thể đưa ra thêm khuyến nghị



Hướng dẫn chế độ ăn	
1 ngày trước	• Ngừng - Tất cả thức ăn sau 12 giờ đêm • Ngừng - Tất cả chất lỏng sau 12 giờ đêm
Ngày thực hiện thủ thuật	Không ăn hoặc uống vào ngày thực hiện thủ thuật

Ngày thực hiện thủ thuật	
Chế độ ăn	Không ăn hoặc uống vào ngày thực hiện thủ thuật
Khi đến	• Vui lòng đến trước giờ thủ thuật 1-1,5 giờ • Bạn sẽ làm thủ tục đăng ký khi đến
Trước thủ thuật	• Nhóm lâm sàng sẽ thực hiện đánh giá lâm sàng và trao đổi về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật • Nhóm gây mê sẽ giải thích đầy đủ các nội dung trước thủ thuật • Bạn sẽ cần ký các mẫu đồng ý thực hiện thủ thuật



An thần	• Một đường truyền tĩnh mạch sẽ được đặt vào cánh tay để truyền thuốc • Bạn sẽ được dùng thuốc an thần qua đường tĩnh mạch trong thủ thuật
Tư thế	Bạn sẽ được hướng dẫn nằm nghiêng bên trái, co đầu gối về phía ngực
Quan sát hình ảnh	Sau khi an thần, ống nội soi kết hợp X-quang được đưa qua miệng và nhẹ nhàng tiến vào để quan sát đường mật và ống tụy
Chẩn đoán	• Nếu cần lấy mẫu mô chẩn đoán hoặc sinh thiết, mẫu có thể được lấy qua ống nội soi kết hợp X-quang trong thủ thuật • Có thể lấy mẫu sinh thiết
Điều trị	• Nếu cần can thiệp, sẽ thực hiện trong thủ thuật • Có thể lấy sỏi, xử lý chỗ hẹp và chụp hình trong thủ thuật



Bác sĩ giải phẫu bệnh	• Sinh thiết là các mẫu mô được bác sĩ giải phẫu bệnh xem xét dưới kính hiển vi • Bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ xác định bản chất của các mẫu mô • Bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ gửi báo cáo đến phòng khám của chúng tôi
Tái khám	• Các bác sĩ của chúng tôi sẽ xem xét báo cáo chi tiết • Các phát hiện sẽ được trao đổi chi tiết với bạn trong lần tái khám

Sau thủ thuật	
Hồi phục	• Bạn sẽ được theo dõi trong 30 phút để phát hiện bất kỳ triệu chứng nào • Bạn sẽ tỉnh trong vòng 30 phút nhưng vẫn có thể lơ mơ trong 12-24 giờ • Không tự lái xe trong thời gian còn lại của ngày sau thủ thuật
Phương tiện di chuyển	• Không nên tự lái xe sau thủ thuật • Bạn phải có người từ 18 tuổi trở lên đưa bạn về nhà • Không Uber Lyft Taxi



Triệu chứng	Các triệu chứng bình thường sau thủ thuật: • Đầy bụng • Đầy hơi • Đau bụng nhẹ • Tiêu chảy nhẹ • Yếu mệt Các triệu chứng bất thường sau thủ thuật: • Chảy máu • Nôn ói nhiều • Sốt > 100°F • Đau bụng dữ dội • Bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng hoặc bất thường nào khác • Vui lòng gọi 911 và đến phòng cấp cứu gần nhất
Lịch hẹn	Đảm bảo có lịch tái khám sau thủ thuật 2-3 tuần
Kết quả	• Kết quả của bạn sẽ được trao đổi chi tiết • Sẽ có khuyến nghị điều trị
Câu hỏi	Gọi hoặc nhắn tin GastroDoxs @ 832-632-4070